ESTUDIO SOCIOECONOMICO Y FRECUENCIA DE VIH EN PROSTITUTAS DE LA DELEGACION CUAUHTEMOC EN LA CIUDAD DE MEXICO

Laura Alvarado Figueroa*

RESUMEN

La prostitución en nuestro país representa un problema de salud pública y factor de alto riesgo en la propagación de enfermedades sexualmente transmisibles, incluyendo el SIDA.

En el hospital "Gregorio Salas Flores" se estableció, a partir de noviembre de 1990, el Programa de Atención Integral a la Mujer, cuyo objetivo es el control epidemiológico de enfermedades transmisibles por contacto sexual.

De mayo a septiembre de 1992, y como parte del programa señalado por el hospital, se realizó un estudio descriptivo que tomó como muestra representativa 130 expedientes de las usuarias del programa, para detectar sus condiciones socioeconómicas y la prevalencia de enfermedades sexualmente transmisibles, principalmente la producida por el VIH.

Se utilizaron como fuentes informativas, la historia clínica, el estudio socioeconómico, muestras de laboratorio y de citología vaginal.

En los resultados resaltan como factores socioeconómicos de importancia, que la mayoría de las mujeres dedicadas a la prostitución son jóvenes, solteras, de nivel socioeconómico bajo y empleos anteriores mal remunerados. Entre las enfermedades de transmisión sexual de importancia destaca la condilomatosis y la prevalencia de VIH es baja.

Introducción

Desde la época colonial se fundó en la ciudad de México el hospital Amor de Dios, destinado a la atención de prostitutas afectadas por males venéreos. En 1879 fue decretado el primer reglamento de la prostitución con la finalidad de proteger la salud de los soldados. En 1883 se estableció un proyecto de ley para controlar las enfermedades venéreas, siendo una de las medidas

el registro de meretrices. En 1926 se decretó un reglamento para ejercer la prostitución (el último que se conoce), que determina las medidas para evitar la propagación de las enfermedades por contacto sexual. La Ley General de Salud, en 1984, establece la vigilancia sobre la prevención y control de enfermedades transmisibles por contacto sexual.²

Actualmente no se conoce el universo de mujeres que ejercen la prostitución en la República, ya que no se han podido establecer mecanismos de control y en buena proporción esta actividad se mantiene en forma clandestina. Sin em-

^{*} Maestría en Atención Integral de Salud Social. Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico Nacional, México.

bargo, en el Distrito Federal existen asociaciones civiles que brindan asistencia social y médica a estas mujeres, como son: "Humanos del mundo contra el SIDA", "Mujeres por la salud en acción contra el SIDA", "Culotzin, salud física y mental y los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, chavos banda y niños de la calle". También existen dependencias gubernamentales como CONASIDA (Consejo Nacional para la Prevención y Control del SIDA) y el hospital "Gregorio Salas" de la Dirección General de Servicios de Salud del Departamento del Distrito Federal.

El hospital "Gregorio Salas Flores" fue inaugurado en septiembre de 1969 como unidad médico-quirúrgica con sus cuatro especialidades básicas, con la finalidad de dar atención a los trabajadores no asalariados del primer cuadro del D.F. Desde su fundación hasta 1988, funcionó como Hospital Materno Infantil, pero en este año cambió su denominación a Hospital General y dio servicio a todo tipo de población.

El hospital se encuentra ubicado en el área geopolítica de la Delegación Cuauhtémoc, en el centro de la ciudad, siendo ésta su principal área de influencia, tiene una población demandante de 1.100,000 habitantes. El tipo de servicio que otorga es de segundo nivel de atención.

MÉTODO

El presente estudio es de carácter epidemiológico, descriptivo y está basado en una muestra no probabilística de tipo intencional o selectivo.

De entre 700 expedientes de usuarias del programa Atención Integral a la Mujer, establecido en el Hospital Gregorio Salas, fueron seleccionados los 130 expedientes (en un periodo comprendido de mayo a septiembre de 1992) que presentaron información completa con respecto a las siguientes fuentes de información: historia clínica, estudio socioeconómico (elaborado por el personal de trabajo social), resultados de la prueba de Elisa para detectar el VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana) y citología vaginal. Las variables analizadas se detallan a continuación:

- Edad
- Estado civil actual

- Escolaridad (años terminados) -
- Características de la vivienda
- Ingreso mensual
- Empleo anterior
- Años de ejercer la prostitución
- Edad de inicio de vida sexual activa
- Método anticonceptivo
- Adicción a substancias tóxicas
- Enfermedades ginecológicas
- Enfermedades de transmisión sexual

RESULTADO

- De los 130 expedientes, 96 (74%) son mujeres entre los 15 y 24 años de edad, de las que 92 (70%) son solteras.
- 47 (36%) de las usuarias tienen escolaridad primaria, siendo el promedio de estudios cuarto grado de educación básica.
- Las características de las viviendas son: 74 mujeres (57%) viven en un cuarto y el baño es colectivo; 32 (24%) viven en un cuarto y cocina, el baño es colectivo; 18 (14%) tienen un cuarto, una cocina y un baño de uso personal, y 6 (5%) viven en hoteles.
- La ganancia mensual de 120 (92%) de las mujeres estudiadas es de un rango de 0 a 800 nuevos pesos.
- 112 personas (82%) tenían un empleo anterior, siendo el más representativo el de doméstica en 84 de ellas (64%).
- El tiempo de ejercer la prostitución ha sido de 2 meses a 5 años en 106 de los casos (81.5%).
- La vida sexual activa en 109 casos (84%) da inicio entre los 15 y 24 años de edad.
- Los métodos anticonceptivos utilizados son: oral en 51 casos (40%), local (preservativos) en 36 (28%). Sin embargo, 50 (38%) de las pacientes utilizan lo métodos de anticoncepción en forma combinada.
- De las enfermedades ginecológicas de las usuarias se presentaron padecimientos de origen infeccioso: cervicitis bacteriana en 73 casos (56%) y cervicitis por tricomonas en 2 (1.5%). De las enfermedades ginecológicas no infecciosas: pólipo vaginal en un caso (0.7%), amenorrea secundaria en 3 (2.3%) y cáncer cervicouterino en uno (0.7%).
- Enfermedades de transmisión sexual encontradas fueron: condilomatosis en 5 casos (3.8%),

el VIH positivo en un caso (0.7%) y la candidiasis en 6 (4.6%) casos.

DISCUSIÓN

El estado de salud del grupo arroja mayor prevalencia de enfermedades ginecológicas infecciosas con respecto a las no infecciosas. Datos similares encontrados por otros autores muestran que dichas enfermedades están relacionadas directamente con el tipo de actividad que desarrollan. 6.7

Con respecto a la presencia de seroprevalencia para VIH, el estudio muestra un caso seropositivo que es 0.7%. La muestra es limitada y un caso detectado es poco significativo desde el punto de vista estadístico; sin embargo, habla de una prevalencia inferior en relación con otros estudios en los que se reportan datos de VIH de 2.3% en 989 y de 1.2% en 914 prostitutas.^{8,9}

CONCLUSIONES

El estudio realizado a las usuarias del programa Atención Integral a la Mujer, muestra que la mayoría son mujeres jóvenes, solteras, con bajo nivel de escolaridad. Estos datos podrían ser factores condicionantes que inclinen a estas personas a la práctica de la prostitución y su persistencia. ^{3,10}

No se demuestra que exista miseria extrema en este grupo, aunque las condiciones de vida de la mayoría de sus integrantes son precarias.³

La mayoría contaba con un empleo anterior, lo cual demuestra que no es el desempleo sino la posibilidad de lograr una mejoría económica lo que inclina a estas mujeres al ejercicio de la prostitución.⁵

Es importante señalar que la seroprevalencia de VIH en este grupo de riesgo fue baja en este estudio, y que trabajos similares de otros autores en nuestro país, mostraron también incidencias bajas en el mismo tipo de población. Sin embargo, debemos tomar como ejemplo a Nairobi, país de Africa, donde en 1980 se hizo el primer estudio en prostitutas y se encontró que el 4% de las mismas estaban infectadas; cuando este mismo estudio se repitió en 1985, se había

alcanzado 59% de seropositividad, y en el Congreso de Washington se reportó que esta cifra había ascendido al 90%.¹¹

Una vez que se introduce el virus del SIDA en la problación heterosexual, la velocidad de transmisión aumenta en forma vertiginosa. De ahí la importancia de programas como el de "Atención Integral a la Mujer" donde se toman medidas de prevención y control a fin de evitar la propagación de esta enfermedad mortal.

SUMMARY

In our country the prostitution is a problem of public health, and a high risk factor for the propagation of sexual transmission diseases.

The "Gregorio Salas Flores" hospital, established a program of integral attention to women in November 1990, in order to obtain the epidemiologic control of sexual contact diseases.

In 1992 a descriptive study was made using 130 files from such program as an informative source of the socioeconomic status and prevalence of diseases.

The results showed that the most common sickness of sexual transmission is conditomatosis and the prevalence of the VIH among prostitutes is very low.

BIBLIOGRAFIA

- Franco, G.R. La prostitución. Edit. Diana, México, 77-112, 1973.
- 2. Ley General de Salud, Edit. Porrua, México pp. 25-29, 1989.
- Gómez Jara F, Barrera E. Sociología de la prostitución. Edit. Fontamara, México pp. 23-150, 1991.
- Conclusiones de las Jornadas de "Análisis sobre la prostitución como problema social en el Distrito Federal". La asamblea de Representantes de México, D.F., pp. 1-5, 1989.
- Romero A, Quintanilla L., Prostitución y Drogas, Edit. Trillas Séptima reimpresión, México pp. 9-63, 1990.
- 6 Orosco R. "Prevalencia de infección por VIH y su relación con otras enfermedades transmitidas sexualmente en un grupo de prostitutas en Chiapas" Rev. Investigación Clínica. México pp. 43-397 1991.
- Philpot Cr, Harcourt Cl, Edwaeds JM. "A survey of female prostitutes at risk of HIV infection and other sexually transmissible diseases". Genitoriun Med. pp. 67-384-388, 1991.

- 8. Uribe P, Hernández M. "Prostitución y Sida". Il Congreso Nacional de Investigación en Salud Pública. México, 1991.
- 9. Uribe P., Hernández M. "Propagación del VIH y estrategias de prevención entre prostitutas". Bo-
- letín Mensual Sida/ETS. México, 8-1197, 1991.
- 10. Uribe P. "La prostitución y el SIDA". Gaceta Conasida. México 4: 6-9, 1990.
- 11. Sepúlveda J. SIDA: *Un problema de Salud Universal*. Memorias de Simposio México p. 9, 1987.