



Infección del tracto urinario por *Schistosoma haematobium*. Un caso en Cuernavaca, Morelos. México

Francolugo-Vélez VA,¹ Zarzosa-Alguiar J.²

Resumen

La Esquistosomiasis, llamada también Bilhariosis o Bilharsiosis, es una enfermedad que puede causar cistitis hemorrágica y asociarse a cáncer vesical. La esquistosomiasis es causada por *Schistosoma haematobium*, es más frecuente en África y en el medio Oriente y es de alta contagiosidad para el ser humano durante la fase larval del platelminto.

Caso clínico: Masculino de raza negra, de 24 años de edad originario de Nigeria, con hematuria discreta de un año de evolución. La *urotac* reveló microlitiasis renal en el cáliz medio del riñón derecho y tumoraciones vesicales. La biopsia por cistoscopia reportó cistitis aguda y crónica con hemorragia y metaplasia epidermoide, lesión consecutiva a infección por huevos de *Schistosoma haematobium*. Se administró tratamiento con praziquantel.

Palabras clave: *Schistosoma haematobium*, hematuria, México.

ABSTRACT

Schistosomiasis, also known as Bilharziasis or Bilharsiosis, is a disease that can cause hemorrhagic cystitis and be associated with bladder cancer. Schistosomiasis is caused by Schistosoma haematobium. It is more frequent in Africa and the Middle East and is highly contagious for humans in the larval stage miracidia phase of the platyhelminth worm.

Clinical case: The patient is a 24-year-old Nigerian man presenting with mild hematuria of 1 year progression. Kidney microlithiasis in the middle calyx of the right kidney and bladder polyps were revealed by 64-slice computerized tomography. Cystoscopic biopsy reported acute and chronic cystitis with hemorrhage and epidermoid metaplasia, a lesion following *Schistosoma haematobium* egg deposition. Patient was treated with praziquantel.

Key words: *Schistosoma haematobium*, hematuria, Mexico.

INTRODUCCIÓN

La Esquistosomiasis, antiguamente llamada Bilhariosis (o Bilharziosis) es una enfermedad parasitaria producida por un gusano platelminto de la clase trematodos, relativamente común en los países en desarrollo, especialmente en África,¹ zonas rurales centrales de China y Egipto,² llamado *Schistosoma* (o esquistosoma).¹ Data

de tiempos antiguos ya que huevos de bilharzia han sido encontrados en momias y la hematuria (principal síntoma) ha sido registrada en papiros antiguos de Kahum en Egipto.

En 1851, Theodoro Maximilian Bilharz descubrió los parásitos en la circulación portal y los asoció como agentes causales de cistitis.¹⁻³ Piraja da Silva la describió por

¹Urólogo. Sanatorio Henri Dunant, Profesor Universidad Autónoma del Estado de Morelos. México.

²Patólogo. Hospital Carlos Calero Elorduy, ISSSTE. Cuernavaca, Morelos. México.

Correspondencia: Dr. Víctor Alfonso Francolugo Vélez. Pericón esquina Angélica 5º piso-502. Colonia Miravaca. Cuernavaca, Mor. Teléfono y Fax: (777) 314 0555. *Correo electrónico:* urovaiv@netfm.com.mx

primera vez en 1908.¹ Ferguson, en 1911, fue el primero en reportar la alta frecuencia de cáncer de vejiga y su relación etiológica con bilharziasis urinaria.³

Hay cinco especies de parásitos *Schistosoma* que producen esquistosomiasis en humanos, cada uno con sus manifestaciones clínicas respectivas:^{4,2}

- *Schistosoma mansoni* y *Schistosoma intercalatum*, causan esquistosomiasis intestinal.
- *Schistosoma japonicum* y *Schistosoma mekongi*, causan la variedad asiática de la esquistosomiasis intestinal.
- *Schistosoma haematobium*, causa esquistosomiasis urinaria.⁵ Es más frecuente en África, el Medio Oriente y el Mediterráneo.¹

La enfermedad es el resultado de la respuesta granulomatosa del huésped hacia el huevo del *Schistosoma*, la patofisiología se relaciona con el ciclo de vida del parásito. La forma larvaria es la fase cercaria, en la que el parásito es libre con cola, se encuentra en el agua dulce, es la forma infectante, esta se transforma en el molusco caracol de agua dulce *Bulinus*, este es el huésped intermediario donde tiene lugar su reproducción asexual y posteriormente liberan al agua las cercarias⁶ que al entrar en contacto con el humano penetra la piel (basta diez segundos de contacto con la piel humana, con agua contaminada para que la larva penetre la piel),⁶ pierde su cola y penetra al torrente circulatorio.

La fase de *Schistosomula* ocurre en los vasos hepáticos, ahí mudarán al estado adulto y tras la fecundación las hembras alcanzarán, a través del sistema portal, los plexos vesicales.

Gusano adulto: Tiene una longitud de 10 mm a 15 mm y 2 mm de ancho; estos emiten sus huevos en los vasos sanguíneos adyacentes a la vejiga, atravesando la pared de la misma, caen en su luz y se eliminan por la orina. Los gusanos adultos pueden vivir de dos a 18 años, y ellos no causan reacción inflamatoria vascular, tan solo aparece una inmunidad progresiva.⁷

Huevo: Son los causantes de las primeras manifestaciones, muy pocas veces tomadas en cuenta y de la posterior enfermedad crónica que es la Esquistosomiasis.

El principal daño va a ser la formación de granulomas por el proceso inmunológico contra los huevos y el parásito. Puede haber una esquistosomiasis inactiva que ocurre cuando los gusanos adultos han muerto, y no se presentan huevos viables en tejidos u orina y se encuentra la presencia de granulomas en los que puede haber huevos calcificados en la pared de la vejiga, llamados granuloma Bilharziano.⁷

Cuando los huevos viables regresan al agua dulce, abren y de ellos sale un embrión llamado miracido, que nada hacia un molusco, el *Bulinus*, cuyos tegumentos atraviesan para acabar transformándose en

las formas larvarias del parásito, infestando el caracol, de este modo se repite el ciclo.

Manifestaciones clínicas: La forma aguda es llamada síndrome o fiebre de Katayama, es raro encontrarla, ya que ocurre de tres a nueve semanas después de la infección, caracterizada por fiebre, linfadenopatía, esplenomegalia, eosinofilia, urticaria, dermatitis en la zona de penetración, dolor de cabeza y malestar general.

La forma crónica por la presencia de los huevos en la pared de la vejiga, uréter u órganos genitales y su reacción inflamatoria granulomatosa acompañante, ocurre a los dos meses pero puede presentarse hasta siete meses después de la infección y se caracteriza por hematuria discontinua, de sangre rojo brillante, que puede acompañarse de disuria, poliaquiuria, también se puede presentar vejiga disminuida de capacidad, con dolor en la parte baja de la espalda, dolor pélvico, urgencia e incontinencia, pudiendo presentar ulceraciones en la vejiga, e inclusive llegar al carcinoma de vejiga (epidermoide).

Diagnóstico: Se establece por estudio del sedimento urinario, en busca de huevecillos; la recolección se debe de realizar entre las 11 y las 14 horas del día, momento en el que al parecer, la expulsión del parásito es máxima;⁸ se clasifica como infección leve, menor o igual a 50 huevos por 10 mL; y grave, mayor a 50 huevos por 10 mL;⁵ el recuento de la cantidad de huevos en la muestra de orina permite evaluar la severidad de la infección.

El mismo análisis de orina permite comprobar la presencia de proteinuria o hematuria; la citología urinaria puede revelar la presencia de células tumorales.

Se ha informado de una prueba de ensayo inmunoenzimático (ELISA) en Gimvi, India, que utiliza antígenos derivados de gusanos adultos de *S. haematobium* y *S. mansoni*. Se ha señalado que los pacientes que excretan óvulos de schistosomiasis en la orina, suscitan títulos de ELISA positivos.²

Así también, la medición de Proteína Catiónica del Eosinófilo en orina, será más elevada mientras mayor sea la invasión al aparato urinario, ya que puede estar combinada no sólo con lesiones a la vejiga, sino también del tracto urinario superior.^{2, 9, 10}

En el Reino Unido, existe una variedad de métodos serológicos para el diagnóstico de la esquistosomiasis. El Hospital de Enfermedades Tropicales en Londres, utiliza una enzima de ensayo inmunoenzimático (ELISA) con crudo *Schistosoma mansoni*, antígenos solubles de huevo (SEA), que se ha comunicado con una especificidad de 97% y sensibilidad de 96% (*S. mansoni*); y 92% (*S. haematobium*).¹¹

La radiografía simple de abdomen puede mostrar calcificaciones lineales finas más o menos continuas en la pared de la vejiga, una calcificación total de la pared




Imagen 1. En el estudio de URO-TAC, a nivel vesical, las flechas señalan dos pequeñas tumoraciones; la de la cúpula vesical mide aproximadamente 8.6 mm.




Imagen 2. En esta proyección, y señalado por las flechas, se evidencian tres tumoraciones en la vejiga, que demuestran los defectos de llenado.

de la vejiga, *vejiga en porcelana* o una calcificación en el segmento distal del uréter. El ultrasonido ha demostrado ser útil para el diagnóstico de infección del tracto urinario por *Schistosomiasis haematobium*, datos en el ultrasonido como pared vesical mamelonada, gruesa, pólipos vesicales sésiles o pediculados, o dilatación pielocalicilar, con cavidades irregulares; desafortunadamente sólo la patología severa puede ser visualizada y las lesiones de la vejiga leves no se pueden detectar por medio de esta técnica.⁹ La urografía excretora puede localizar estenosis ureterales o puede encontrarse hidronefrosis, como consecuencia de este tipo de parasitosis.

La cistoscopia se realizará en aquellos casos en que el recuento de huevos no es concluyente y permita tomar una muestra para biopsia que además podrá descartar degeneración neoplásica. Definitivamente por la conclusión a que llega da Silva,¹² la cistoscopia es un importante examen para la detección en casos de hematuria y otras afecciones de la vejiga, en la investigación de la enfermedad por *S. haematobium*, particularmente en los casos en que la evaluación semiológica por métodos no invasivos es incapaz de establecer un diagnóstico.

Se deben realizar controles cada seis meses, complementando con biopsia de la vejiga urinaria en los casos en que se observa alteraciones de la mucosa vesical, repetir estudios inmunológicos y de ser necesario administrar nuevo tratamiento y seguimiento con cistoscopia.¹²

Tratamiento de elección: El prazicuantel, es activo para todas las formas clínicas y estadios de la enfermedad a dosis de 40 mg por kg de peso, en una sola toma.

■ PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente masculino de 24 años, de raza negra, originario de Nigeria. Estudiante en el Tecnológico, con becado de su país en Cuernavaca, Morelos, México, desde hace tres años. No refiere antecedentes de importancia.

Se presentó a consulta en julio de 2008, por presentar dolor en cuadrante superior izquierdo del abdomen, de tipo cólico, discreto y en ocasiones al respirar profundo, náusea con duración de unos 15 segundos, de aparición una o dos veces a la semana, no había molestias para orinar, pero ocasionalmente al iniciar la micción presentaba muy discreta hematuria, este síntoma con un año de evolución. El ultrasonido renal reportó un cálculo en el cáliz medio del riñón izquierdo de aproximadamente de cinco milímetros.

La nefrotomografía simple resultó muy dudosa a la presencia del cálculo referido en el ultrasonido anterior. El análisis general de orina reportó algunas bacterias, uno a dos eritrocitos por campo y huellas de proteínas. Se le solicitó URO-TAC, que demostró microlitiasis renal derecha del cáliz medio, no obstructivo, de aproximadamente tres milímetros. Además de pólipos vesicales múltiples (**Imágenes 1 y 2**).

La cistoscopia posterior, demostró tumoraciones de las cuales se tomaron biopsias. Estas se encontraban en la línea media, desde la cúpula hacia el trigono, a uno o dos centímetros de distancia entre ellas y de color amarillento. Al corte se observó la salida del cuerpo de un parásito. (**Imágenes 3, 4 y 5**).

Al interrogatorio intencionado, refirió que se bañaba en un río cercano a su casa. Los primeros síntomas




Imagen 3. Una de las tumoraciones vesicales durante la cistoscopia.



Imagen 5. Toma de tejido de una de las tumoraciones y en el borde se ve la salida del cuerpo de uno de los parásitos.

aparecieron a los ocho años, manifestado por dermatitis en el tórax y en la espalda, con prurito y pequeñas ulceraciones.

Se sospechó de esquistosomiasis por lo que se decidió darle tratamiento con prazicuantel, una sola toma (40 mg por Kg). El resultado histopatológico de la biopsia confirmó el diagnóstico de cistitis aguda y crónica hemorrágica con metaplasia epidermoide, por lesión consecutiva a *S. haematobium* (**Imagen 6**).

Un mes y medio posterior al tratamiento, se realizó nueva cistoscopia y exámenes de laboratorio para

detección de huevecillos o parásitos en la orina. La citología en orina fue negativa para células malignas y no hubo evidencia de parásitos.

Como efectos secundarios del tratamiento hubo cefalea intensa y un episodio de lipotimia. En la cistoscopia se observó la mucosa pálida en algunos sitios, con zonas enrojecidas, con granulomas pequeños sin tumoraciones. Se tomó biopsia de la misma y el estudio histopatológico reportó: tres fragmentos fusiformes de cinco a siete milímetros, ahulados, de color café claro, ligeramente reblandecidos. Al microscopio se observó




Imagen 4. Durante la toma de la biopsia, hubo la salida de un parásito. En el recuadro, una imagen obtenida de la Internet⁵ de una hembra en canal ginecóforo del mac



proceso inflamatorio crónico con formación de linfocitos y células plasmáticas, con histiocitos de citoplasma intermedio. Se identificó el urotelio sin anomalías de maduración. No se identificaron parásitos. El diagnóstico fue: cistitis sub-aguda y crónica, no se observaron elementos neoplásicos malignos.

Dos estudios más en marzo y octubre de 2009, fueron normales ya no hubo hematuria.

■ DISCUSIÓN

Más de 200 millones de personas en el mundo, en regiones tropicales padecen de esquistosomiasis.¹¹ Su presentación urinaria es causada por el *Schistosoma haematobium*, endémica en 54 ciudades de África. Los estudios en niños en edad escolar, muestran una alta prevalencia de infecciones por *S. haematobium*. Los humanos pueden infectarse al entrar en contacto con agua contaminada, los gusanos se instalan en las venas del plexo vesical y pélvico, en donde las hembras depositan de 20 a 290 huevecillos al día. El tracto urinario bajo, los uréteres y las vesículas seminales son los órganos más afectados. Las lesiones se caracterizan por granulomas causados por la respuesta de los tejidos frente a los huevecillos.¹³

El *Schistosoma haematobium* es la causa más común de hematuria en ciudades endémicas.⁵ En la mujer, útero, cérvix y vagina son los más afectados; los síntomas principales son: hematuria, disuria, dolor lumbar, datos de infección bacteriana, dismenorrea, leucorrea, dolor abdominal en hipogastrio y sangrado inter-menstrual.¹³

La identificación de casos que ameritan tratamiento por la infección de *S. haematobium*, generalmente se basa en la detección microscópica de los huevos en orina. En poblaciones endémicas, y en especial en niños. En los datos de 45 estudios que incluyeron 74 escuelas y 28 comunidades, evaluaron la prevalencia de microhematuria detectada, encontrándose que la prevalencia de ésta era discretamente inferior en las comunidades que en las escuelas (16% contra 24%) y se enfocó a la evaluación de cuatro técnicas para detectar la patología o morbilidad de *S. haematobium*: patología vesical por ultrasonido, microhematuria en tiras reactivas, macrohematuria por interrogatorio o examen macroscópico de orina; dando como conclusiones que el ultrasonido detecta más casos en los niños que en los adultos, con el mismo grado de patología. Fue superior la tira reactiva al interrogatorio.¹⁴

Existe una falta de conocimiento e información en la población sobre el padecimiento ya que sólo 0.78% tenían conocimiento de la enfermedad y 16 de 133 niños (en Mina, Nigeria), manifestaron que presentaron sangre en la orina, por lo que fueron al médico.⁸ Se ha documentado que los niños son infectados con mayor frecuencia que los adultos.⁵




Imagen 6. Huevo de *Schistosoma haematobium*.

En un estudio retrospectivo de 37 años (1970- 2007), sobre el análisis y tendencia en el tiempo de 9843 pacientes con cáncer de vejiga originada por Bilhariazis en la Universidad del Cairo, en Egipto, se informó que afectaba a pacientes principalmente del sexo masculino, con promedio de edad de 46.7 años; el tipo histológico más común es el carcinoma de células escamosas. Los casos con estadio avanzado, invaden la capa muscular por lo que la principal línea de tratamiento es la cistectomía radical.³

En este estudio notaron que los pacientes tratados en los años de 2003 a 2007 mostraron una disminución significativa en la frecuencia del cáncer de vejiga, asociado a una disminución en la frecuencia de huevecillos de este parásito, con disminución del carcinoma de células escamosas e incremento del carcinoma de células transicionales, con una edad promedio de 60.5 años, disminuyendo también la prevalencia en el sexo masculino de 5.4 a 3.3 %.³

En nuestro caso, la cistoscopia fue muy importante, ya que se ha demostrado ésta enfermedad en pacientes que no viven en poblaciones endémicas, pero que han estado en éstas y que han padecido la enfermedad; los resultados aun después de un segundo tratamiento hasta en 33% todavía presentaban granulomas y huevos viables, a pesar de exámenes de orina negativos.³ Además existe la posibilidad de fracaso terapéutico con prazicuantel, lo que hace necesaria la investigación de nuevas alternativas terapéuticas.⁶ Es necesario insistir en realizar cistoscopias de control cada seis meses a un año; situación que aún queda pendiente en nuestro caso, a pesar de sentirse asintomático a la fecha.

BIBLIOGRAFÍA

1. Internet Wikipedia; <http://en.wikipedia.org/wiki/Schistosomiasis> 2009; pag. www.sci-ntds.org.
2. Viroj Wiwanitkit. Overview of clinical reports on urinary schistosomiasis in the tropical Asia. *Pak J Med Sci* 2005;21(4):499-501.
3. Gouda I, Mokhtar N, Bilal D. Bilharziasis and bladder cancer: a time trend analysis of 9843 patients. *J Egypt Natl Canc Inst* 2007;19(2):158-162.
4. Lopes RI, Leite KR, Prando D. Testicular schistosomiasis caused by *Schistosoma mansoni*: a case report from Brazil. *Braz J Infect Dis* 2007;11(5):523-524.
5. Nmorsi OP, Ukwandu NC, Ogoinja S. Urinary tract pathology in *Schistosoma haematobium* infected rural Nigerians. *Southeast Asian J Trop Med Public Health* 2007;38(1):32-37.
6. Silva IM, Pereira Filho E, Thiengo R. Schistosomiasis haematobia: Histopatological course determined by cystoscopy in patient in whom praziquantel treatment failed. *Rev Inst Med Trop Sao Paulo* 2008;50(6):343-346.
7. Murra Atlas de Videoendoscopia. El Salvador 2009. http://www.gastrointestinalatlas.com/Espanol/Colon_y_Recto/Parasitos/parasitos.html
8. Chidozie EU, Daniyan SY. Urinary schistosomiasis epidemiological survey of urinary schistosomiasis among children in selected schools: A preliminary study in Minna, Nigeria. *African J. of Biotechnology* 2008;7(16):2773-2776.
9. Leutscher PD, Reimert CM, Vennervald BJ. Morbidity assessment in urinary schistosomiasis infection through ultrasonography and measurement of eosinophil cationic protein (ECP) in urine. *Trop Med Int Health* 2000;5(2):88-93.
10. Reimert CM, Mshinda HM, Hatz CF. Quantitative assessment of eosinophiluria in schistosoma haematobium infections: A new marker of infection and bladder morbidity. *Am J Trop Med Hyg* 2000;62(1):19-28.
11. Turner P, Laloo K, Bligh J. Serological speciation of human schistosome infections by ELISA with a panel of three antigens. *J Clin Pathol* 2004;57(11):1193-1196.
12. Silva IM, Thiengo R, Conceição MJ. Cystoscopy in the diagnosis and follow-up of urinary schistosomiasis in Brazilian soldiers returning from Mozambique, Africa. *Rev Inst Med Trop Sao Paulo* 2006;48(1):39-42.
13. Tzanetou K, Adamis G, Andipa E. Urinary Tract *Schistosoma Haematobium* Infection: A case Report. *J Travel Med* 2007;14(5):334-337.
14. van der Werf MJ, de Vlas SJ. Diagnosis of urinary schistosomiasis: a novel approach to compare bladder pathology measured by ultrasound and three methods for hematuria detection. *Am J Trop Med Hyg* 2004;71(1):98-106.